

# 25 años de Tornados en Catalunya (1992-2017)

Joan Arús Dumenjó<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> AEMET, Delegación de AEMET en Catalunya, jarusd@aemet.es

## RESUMEN

Desde 1992 tenemos registrados en Cataluña unos 400 fenómenos tornádicos, incluyendo tornados, mangas marinas y reventones o fenómenos similares como turbonadas, frentes de racha, derechos y casos dudosos. Las tubas no se han tenido en cuenta, pero si las considerásemos tendríamos unos 600 casos con un aumento significativo los últimos años. Para una climatología 25 años es poco, ya que sería necesario un mínimo de 30 años o más (35-40) tratándose de fenómenos raros como es el caso de los tornados. No obstante, con estos 25 años se presenta una aproximación de climatología tornádica por comarcas. Previamente se describen los principales y más mediáticos fenómenos anteriores a 1992, los EF2 y EF3 del período en estudio así como los métodos y fuentes de recogida de datos y tasación, además de los entornos meteorológicos más favorables.

**PALABRAS CLAVE:** “tornado”, “manga marina”, “reventón”, “turbonada”, “derecho”, “tuba”.

## 1. INTRODUCCIÓN

Esta presentación un tanto nostálgica tiene su motivación principal en la asistencia del autor por primera vez a un simposio nacional de predicción, que fue a finales de 1992, cuando se desarrolló el III Simposio y el autor recién destinado en Barcelona asistió en calidad de oyente. A pesar de que las mangas marinas es y ha sido un fenómeno relativamente frecuente en la costa catalana, como veremos más adelante, me impactaron las conferencias que presentaron Miquel Gayà (Gayà y Soliño, 1996) y Antonio Soliño (Soliño y Gayà, 1996), sobre "Caps de Fibló" en Baleares, palabra que escuché por primera vez, y que es la forma habitual de designar a las mangas y tornados en Baleares. Poco después, en 1994 a raíz del tornado de l'Espluga de Francolí, tuve ocasión de conocer y colaborar con Miquel Gayà que en el trabajo de campo de este episodio, una colaboración que ha continuado hasta nuestros días. En el IV Simposio de 1996 (Arús et al., 1999), ya me estreno presentando un trabajo sobre la situación del 31 de agosto de 1994 que dio lugar a unos de los tornados más mediáticos ya que su video dio la vuelta al mundo siendo de los primeros en España filmados lo cual dio lugar a otro estudio de cálculo de la velocidad a partir de las imágenes fotogramétricas a cargo de Miquel Gayà y Ángel Redaño (Gayà y Redaño, 1999) En el V Simposio de 2002 presento otro trabajo relacionado, un estudio de Reventones cálidos (Arús, 2002) y, tras esta pausa de 15 años, y como no podía ser de otra manera, presento este trabajo

resumen de todos los fenómenos tornádicos vividos y registrados, incluyendo mangas, tornados y reventones.

A pesar de que las trombas son y han sido un fenómeno conocido y habitual en la costa catalana, la a tromba famosa por excelencia es la de Sant Feliu de Guíxols-Calonge-Palamós del 2 de septiembre de 1965 (Sánchez-Laulhé et al., 2017) y (Arús, 2018); quizás por las dimensiones y por la cercanía a la costa de Sant Feliu de Guíxols así como la duración, unos 35 minutos, unos 2km longitud, y que fuera domingo, etc: lo cierto es que dio tiempo a curiosos a buscar cámara fotográfica para inmortalizarla: más de 80 fotos, algunas en color y todo, así como un video 2 minutos ha podido recoger el activista cultural y fotógrafo guixolense Jordi Ferrando para la conmemoración del 50 aniversario de la tromba<sup>1</sup>. **(Figura 1)** Representa un punto de inflexión en los estudios de tornados en Cataluña ya que se considera la primera manga marina fotografiada que además adquirió difusión internacional ya que un turista holandés que la fotografió le dedicó una comunicación en la revista científica *Hemel en Dampkring* ( Blokland, 1965 ). Su silueta sirvió para ilustrar al capítulo “torbellinos marinos” del libro *Las Tormentas* de Editorial Planeta. (Castelló, 2009)

No obstante, los registros de fenómenos tornádicos antiguos constituyen una base de datos poco homogénea y completamente abierta a nuevas incorporaciones, la última esta referencia aportada por la cuenta de twitter del archivo municipal de Sant Pol<sup>2</sup> conmemorando los 120 años de una manga marina.

En (Gayà, 2015) podemos encontrar una amplia descripción de todos los casos conocidos en la costa catalana agrupados así: antes de 1800, 1801-1900, 1901-1980 y 1980-2012; mostrando una distribución bastante regular. En (Gayà et al., 2011) se agrupan así: 1950-1979 y 1980-2009; y en este caso de nota un desplazamiento del máximo de casos observados hacia la costa central claramente influenciado por la densidad de población. **(Figura 2)**

## 2. BASE DE DATOS, CONSIDERACIONES Y ALGUNOS CASOS

A partir de 1992 coincidiendo con mi incorporación al GPV de Barcelona, pero especialmente a partir de 1994 coincidiendo con el tornado de l’Espluga de Francolí voy anotando todos los fenómenos tornádicos de los que tengo conocimiento a la vez que voy incorporando todos los antiguos de los que se tienen noticias, fundamentalmente por libros y prensa antigua. Como se ha dicho el primer trabajo de campo, que fue de 3 días por encargo del INM, se desarrolló en l’Espluga de Francolí en septiembre de 1994, con métodos muy rudimentarios, unos planos que nos facilitaba el Ayuntamiento, lápiz y brújula; siguiendo la metodología propuesta por Gayà. (Gayà, 2015) El siguiente trabajo de campo de desarrolla en Batet de la Serra en 1996, también con Miquel Gayà desplazado por encargo de INM y por primera vez estrenamos un GPS. En el trabajo de campo del Tornado de Castellcir de 18 de octubre de 2006 también con Miquel Gayà y en colaboración con el Servei Meteoròlogic de Catalunya se realiza una parte

---

<sup>1</sup> <http://latrombadel65.blogspot.com.es/>

<sup>2</sup> <https://mobile.twitter.com/ArxiuSantpol/status/1023470709035737088?s=03>

del reconocimiento en helicóptero aunque los resultados no son todo lo buenos que se podría esperar. En el trabajo de campo del tornado del 21 de marzo de 2006 de Ivars d'Urgell, el último que me encargó AEMet, por primera vez utilizamos la tecnología móvil Android con ploteo de waypoints online y google Earth (**Figura 3**). En uno de los últimos trabajos de campo realizados, el del 7 de enero de 2018, probablemente el de mayor recorrido de los que se tienen conocimiento en esta base de datos con 45,5 Km. (Rodríguez et al. 2018) se utiliza por primera vez el dron. Ha sido uno de los trabajos de campo más extensos y con días más cortos, ya que es el segundo en un mes de enero de la serie y el primer trabajo de campo en estos días de pocas horas de luz. Se realizó el mismo día 7 por la tarde y continuó días después siguiendo la metodología propuesta en (Rodríguez et al. 2018). El estudio permitió certificar que se había producido un tornado de intensidad EF2 según la escala de Fujita mejorada (Wind Science and Engineering Center, 2006) y enlazar la traza de daños con los destrozos ocasionados por el tornado del otro lado del Pirineo (Plouvien, 2018).

Como se puede apreciar la base de datos con visitas y trabajos de campo sería muy pequeña, por lo que a mí se refiere. No obstante recopilando todas las visitas otros compañeros y multitud de gente como meteorólogos aficionados y colaboradores de AEMET además de la información ofrecida por medios de comunicación, pero en especial por el equipo de meteorólogos de TV3, hemos podido ampliar la base de datos. A partir de 2003 y 2004 la fotografía digital, las Webcams e Internet aportan multitud de casos. Posteriormente las redes sociales y los smartphones favorecen la difusión inmediata de los fenómenos tornádicos, en especial twitter; mi cuenta de twitter @jarusgpv data de 2010, en su origen para este menester. Casi a la par los modelos numéricos online como Estofex ayudan a los “cazatornados” puedan estar en el lugar y momento adecuado, incluso de noche, dando lugar a muchas fotografías nocturnas con largas exposiciones donde aparecen mangas marinas entre rayos. Así las cosas, es fácil suponer que la percepción de estos fenómenos ha aumentado considerablemente en estos últimos años y, lejos de estancarse, la eclosión de la telefonía móvil y la mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram hacen que continúe aumentando la percepción, con las limitaciones que puede tener, como por ejemplo la aparición de “fakes” que hay que saber filtrar adecuadamente. Por ejemplo en el tornado de Valls de 18 de octubre de 2017, sin ninguna fotografía conocida, voluntaria o involuntariamente circuló por redes sociales rápidamente una fotografía del tornado de Vilabella del 30 de mayo de 2014.

En un primer momento también se anotaban tubas, unas 600, pero el rápido crecimiento de estas observaciones así como las pocas o nulas referencias anteriores hacen poco útil la comparativa. De entre todos los fenómenos registrados o conocidos, 490 exactamente entre el 1 de septiembre de 1992 y el 1 de septiembre de 2018, 133 son tornados, 280 mangas y 77 reventones ( o similares como derechos, turbonadas, frentes de racha, reventones no convectivos etc. o casos dudosos). De todos ellos, unos 50 tienen visita de campo, es decir aproximadamente el 25% de los fenómenos tornádicos terrestres. No siempre se han podido realizar el mismo día o días siguientes con lo que la zona a explorar queda restringida a bosque ya que las zonas urbanas quedan limpias rápidamente. En la mayor parte de trabajos de campo se ha observado que la dirección de caída de los árboles obedece a un patrón

compatible con el desplazamiento de un vórtice (Bech et al. 2009) , (Gayà, 2005) o (Soliño, 2015) . También se han tenido en cuenta la relación de árboles afectados o la proporción entre anchura y longitud de la traza (Rodríguez et al., 2018). De todos estos trabajos de campo, destacamos los 10 casos tasados como EF2 que, además casi todos han motivado alguna publicación: l'Espluga de Francolí 31 de agosto de 1994 (Ramis et al. 1997), Lladurs 21 de octubre de 2002<sup>3</sup>, Brucardes-Manresa y Els Hostalets de Balenyà-Centelles 17 de agosto de 2003 (Arús, 2003) y (López y Arús, 2004), El Prat de Llobregat-Aeroport-Sant Boi 7 de septiembre de 2005 ( Bech et al. 2007) , Sant Boi-Sant Feliu de Llobregat 13 de setembre de 2006 (Mateo et al., 2009), Castellcir 18 de octubre de 2006 (Aran et al. 2009), Sarral-Miralcamp-Cabra del Camp 2 de noviembre de 2008 (Bech et al., 2011), Cardona y Cistella-Terrades-Navata-Darnius-Agullana 7 de enero de 2018 (Bech et al. 2018), incluso el de Cabra del Camp gracias a las imágenes de satélite (ortofotos disponibles online, ya sea via ICC<sup>4</sup> o Google Earth) seguramente será retasado como EF3 y, quizás, con el más reciente de 7 de enero de 2017 si, como parece, se confirma la unión de trayectorias con el tornado francés de Maureilles<sup>5</sup> y a la espera de las ortofotos online que suelen tardar en estar disponibles.

Como se ha dicho este corpus de fenómenos tornádicos ha sido posible gracias a observadores y aficionados, peritos del Consorcio de Seguros, medios de comunicación, redes sociales, pero también otras bases de datos como Sinobas, ESWD, Meteocat, y en especial dos bases de datos particulares con las que se ha fusionado y contrastado: la de Miquel Gayà (1981-2012) y la de Oriol Rodríguez (2000-2018)

### 3. ALGUNOS RESULTADOS

A partir de 1992 y considerando todos los 490 fenómenos se obtiene este gráfico resultando una media de 4-5 tornados por año y 12-16 mangas marinas, éstas en claro aumento, si bien creemos que en gran parte es debido la mayor percepción y conocimiento. Únicamente en el primer año no se observó ninguna. (**Figura 4**)

Por meses, como era de esperar el otoño y finales de verano concentran la mayor parte de fenómenos (**Figura 5a**) pero es significativo que todos los meses tienen fenómenos e incluso el mes de enero que solo recogía un caso hasta 2018, en que se ha dado la situación del 7 de enero con 3 tornados y uno de ellos probablemente el más largo de los registrados hasta el momento (Bech et al. 2018) y (Rodríguez et al., 2018). Por franjas horarias, y al no disponer de las horas exactas de cada uno de los fenómenos se han agrupado en mañana, tarde y noche (**Figura 5b** ) En cuanto a la intensidad, tampoco se tienen todos los fenómenos tornádicos tasados, resultando este gráfico (**Figura 5c**)

---

<sup>3</sup> A pesar de ser uno de los 10 tornados más fuertes es el único que no ha motivado estudio alguno, si bien TV3 emitió un espacio del Tiempo en directo desde Lladurs al día siguiente, que me sirvió de guía para el trabajo de campo de días después.

<sup>4</sup> <https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador/>

<sup>5</sup> <http://www.keraunos.org/actualites/faits-marquants/2018/tornade-maureillas-las-illas-7-janvier-2018-pyrenees-orientales-occitanie>

Por otra se han representado tal como se anotan siguiendo una distribución municipal/comarcal por simplicidad, según las 42 comarcas catalanas, como ya se presentó en una primera publicación (Morales et al., 2009). No obstante, y sobre todo debido el reciente aumento de mangas marinas al límite de las 20 millas, coincidiendo con el límite de la cobertura móvil y flujo de embarcaciones, ya sea de recreo o pesca profesional, hacen necesario el replanteamiento de esta representación gráfica para futuros trabajos. Como ya se observó en Morales et al. 2009 se muestra una distribución comarcal de tornados y mangas marinas con un máximo en la zona del Maresme-Baix Empordà, muy probablemente relacionado con la conocida zona de convergencias de la Tramuntana (zona de convergencia catalano Balear (Jansà, 1997) o (Pascual y Callado, 2002). Quizás relacionado con la persistente Tramuntana y el mar frío, no se ha observado ninguna manga en la comarca del Alt Empordà a diferencia del extremo sur de la costa, donde a pesar del también fuerte pero quizás no tan persistente viento de Mestral, además de una temperatura del agua de mar mucho más elevada. En la actualización 1992-2018. (**Figura 6abcd**), se confirma este máximo del sur de la costa Brava-Maresme así como otros máximos casi del mismo orden en la costa central y en la costa Daurada y que probablemente son una contribución doble: la zona de convergencias central y sobre todo la de la costa Durada (Pineda et al., 2011). (**Figura 7**); por otra parte éste máximo de la Costa Daurada se correspondería con un máximo relativo de densidad de descargas eléctricas constatado por las redes de descargas, tanto de AEMet (Riesco et. al. 2015) como de Meteocat (Pineda et al., 2011). (**Figura 8ab**)

#### **4. ENTORNOS FAVORABLES**

Una vez mostrado que el fenómeno de las mangas marinas o tornados en la zona no es inusual entramos en el marco sinóptico favorable para ellos. De muchas de las narraciones históricas, por ejemplo el caso múltiple de marzo de 1883 con 15 mangas (Castelló, 2009) o (Gayà, 2015) ya se describe una fuerte irrupción fría en mar relativamente cálido como detonante de las tormentas que generaron las trombas, como también la de 1962 (Arús, 2017) y (Sánchez-Laulhé et al., 2017). Otros se corresponden con forzamiento sinóptico marcado, pasos de vaguadas con o sin frente frío asociados, como sería el caso del último episodio multitornádico del 7 de enero de 2018 (Bech et al., 2018) , el caso del Derecho del 17 de agosto de 2003 (López, 2007), el 7 de septiembre de 2005 en el aeropuerto de el Prat (Bech et al. 2007) o el de Sarral-Miralcamp-Cabra del Camp 2 de noviembre de 2008 (Bech et al. 2011) Otros con poco forzamiento sinóptico aunque si mesoscálico como el de 21 de marzo de 2006 de Ivars d'Urgell (Bech et al. 2012) y sobre todo efecto diurno como el caso del 31 de agosto de 1994 (Ramis et al. 1999), el 18 de octubre de 2017 en Valls (Bech et al. 2016) , el de Castellcir 18 de octubre de 2006 (Aran et al. 2009) o el de Vilabella del 30 de mayo de 2014 (Bech et al. 2015). En algunos de los casos se han podido identificar estructuras radar "indiciariamente" supercelulares, por ejemplo en el Derecho de 17 de agosto de 2003, el de 7 de septiembre de 2005 en el aeropuerto de el Prat, Castellcir 18 de octubre de 2006, el Sarral-Cabra del Camp de 2 de noviembre de 2008 o los recientes de 7 de enero de 2018 entre otros y sin que esto quiera decir que los tornados fueran supercelulares. En los primeros estudios no se disponía de la tecnología radar actual, pero aún así en el primer tornado estudiado de

l'Espluga de Francolí se concluye que no fue supercelular a pesar de que en la etapa de madurez de la célula es posible que observara supercélula (SP) a partir de la imagen Tiros (Arús et al., 1999) y comparando con el mapa de presuntas supercélulas que elabora “La Meteorología Extrema” en el foro <https://foro.tiempo.com><sup>6</sup> ya se puede observar que son casi complementarios con lo que la mayoría de fenómenos tornádicos no se corresponderían con SP. Además el máximo de fenómenos tornádicos se da en la costa catalana central si bien de los 10 con EF mayor o igual a 2 solamente 2 se dan en esta zona, y en el caso del aeropuerto del Prat del 7 de septiembre de 2005 con estructuras radar supercelulares además de fotografías con aspecto rotacional del cumulonimbo tornádico (**Figura 9**). En muchos otros casos de los fenómenos tornádicos de la costa catalana se han observado fotos parecidas e incluso recientemente con la eclosión de fotografía digital videos “time lapse” con aspectos rotacionales claros<sup>7</sup>, lo que haría pensar, cuando menos, en algún tipo de estructuras supercelulares como mini-SP ( Bech et al., 2018).

Además y cómo podemos ver en los radiosondeos estudiados en los trabajos citados el perfil vertical no presenta valores extremos en los índices que se suelen usar para evaluar la flotabilidad de la columna de aire, salvo quizás la CAPE, pero con valores poco restrictivos y de acuerdo con (Rodríguez, 2014) no se dan tornados EF2 o superiores con valores menores de 500 J kg<sup>-1</sup>. La característica común a todos los casos presentados es el perfil vertical de viento, aún sin ser acusado, presenta una helicidad modesta (efecto sacacorchos) como también se ha demostrado en la mayoría de fenómenos tornádicos de Cataluña (Rodríguez, 2016) que además expone unos umbrales mínimos para los tornados o mangas EF iguales o superiores a EF1. Los resultados indican que la helicidad relativa a la tormenta para la capa 0–3 km, con un valor umbral de 150 m<sup>2</sup> s<sup>-2</sup>, cizalladura del viento para la misma capa, con un umbral de 15 ms<sup>-1</sup>, y parámetros compuestos como SCP (Supercell Composite Parameter) con un umbral de 1.2 y el índice tornádico universal UTI con un umbral de 0.3 son útiles para distinguir entre tormentas sin tornado y EF1 o eventos tornádicos más fuertes. En este sentido (Perea, 2018) propone usar la helicidad efectiva (Thompson, 2006) entendiendo por capa efectiva el estrato representativo del flujo horizontal que podría alimentar la corriente ascendente en la célula convectiva. SRHe (helicidad relativa a la tormenta en la capa efectiva) discrimina mejor que SRH1km y SRH3km entre supercélulas que dan origen a tornados significativos (EF2 o superiores) y las que no dan lugar a tornados. El concepto de “capa efectiva” se puede extender al cálculo de la cizalladura.

## 5. CONCLUSIONES

Para una climatología 25 años es poco, ya que sería necesario un mínimo de 30 años o más (35-40) tratándose de fenómenos raros como es el caso de los tornados. No obstante, con estos 25 años se presenta una aproximación de climatología tornádica por comarcas, que como también se ha comentado no es la mejor representación.

---

<sup>6</sup> <https://foro.tiempo.com/casos-de-presuntas-supercelulas-en-espana-en-2017-normas-y-listado-pagina-1-t148201.252.html>

<sup>7</sup> "Formació de mesociclons a la costa Barcelonina?": <http://youtu.be/QZbaM9IjG3I>

Para el periodo estudiado que va del 1 de septiembre de 1992 y el 1 de septiembre de 2018 se obtiene una media de 4-5 tornados año y 12-16 mangas marinas, éstas en claro aumento, si bien creemos que en gran parte es debido la mayor percepción y conocimiento. Es decir aumento sí, pero no. La máxima frecuencia de mangas y tornados se da en la costa central si bien 8 de los 10 tornados más fuertes se han registrado en el interior. Los máximos del litoral probablemente relacionados con zonas de convergencias clásicas así como una temperatura del agua del mar elevada, sobre todo en otoño, como se observa en el máximo relativo de densidad de rayos. A pesar de observarse características supercelulares en las imágenes radar de algunos de los casos estudiados más recientes, no todos lo son, y la mayoría pertenecen al grupo de tornados no supercelulares.

## REFERENCIAS

- Aran M, Amaro J, Arús J, Bech J, Figuerola F, Gayà M, Vilaclara E, 2009: Synoptic and mesoscale diagnosis of a tornado event in Castellcir, Catalonia, on 18th October 2006. *Atmospheric Research*, 93: 147-160.
- Arús, J; López Pérez, JM; Ramis, C; Mestres, A. 1999: Estudio meteorológico del día 31 de agosto de 1994: Tornado de l'Espluga de Francolí [4º Simposio Nacional de Predicción del INM \(1999\)](#) <http://hdl.handle.net/20.500.11765/4204>
- Arús, J. 2001: Reventones de tipo cálido en Cataluña. V Simposio Nacional de Predicción [CD-ROM]. Madrid: Instituto Nacional de Meteorología. <http://hdl.handle.net/20.500.11765/4699>
- Arús, J. 2003: Mànegues, esclafits i caps de fibló. *Revista de la ACOM*, Penell número 16. (noviembre de 2003). <https://www.researchgate.net/publication/318530630>
- Arús, J. 2017. El fibló del 2 de setembre de 1965 a Sant Feliu de Revista de la ACOM, Penell número 48. <https://www.researchgate.net/publication/322129392>
- Bech J, Rodríguez O, Altube P, Rigo T, Pineda N, Castán S, Arús J, Montanya J. 2018: Doppler radar observations of two tornadic thunderstorm cases in the Western Mediterranean Region. 10th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2018): 1-6 July 2018, Ede-Wageningen, The Netherlands, p. 111, <http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/539463> <http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2017/09/29132849/ERAD18-2cases0702.pdf>
- Bech J, Arús J, Castán S, Pineda N, Rigo T, Montanya J, van der Velde O, 2015: A study of the 21 March 2015 tornadic quasi linear convective system in Catalonia. *Atmospheric Research*, 158–159, 192–209.
- Bech, J.; Castán, S.; Arús, J.; Pascual, R.; Cuevas, G.; Reigó, T.; Pineda, N.; Montaña, J.; Van Der Velde, O. 2015: Analysis of the 30 May 2014 tornadic storm in Vilabella, Catalonia European Conference on Severe Storms 2015 European Conference on Severe Storms 2015, 14–18 September 2015, Wiener Neustadt, Austria <https://meetingorganizer.copernicus.org/ECSS2015/ECSS2015-87-1.pdf>
- Bech J, Pascual R, Rigo T, Pineda N, López JM, Arús J, Gayà M, 2007: An observational study of the 7 September 2005 Barcelona tornado outbreak. *Natural Hazards and Earth System Science*, 7: 129–139.
- Bech J, Pineda N, Rigo T, Aran M, Amaro J, Gayà M, Arús J, Montanya J, van der Velde O, 2011: A Mediterranean nocturnal heavy rainfall and tornadic event. Part I: Overview, damage survey and radar analysis. *Atmospheric Research*, 100: 621-637.
- Bech J, Gayà M, Aran M, Figuerola F, Amaro J y Arús J. 2009 Tornado damage analysis of a forest area using site survey observations, radar data and a simple analytical vortex model *Atmos. Res.*, 93 (2009), pp. 118-130 <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2008.10.016>



Blokland, D. E.: En imposable hoos aun de Costa Brava (An impressive waterspout at Costa Brava), Hemel en Dampkring, vol. LXV, n." 12, The Hague, 1965, pp. 348-349

Castelló "Caste", Josep, 2009: Costa Brava autèntica. Pagès editors

Gayà M y Soliño A 1996: 'Caps de fibló' (trombas o tornados): algunas observaciones recientes. III Simposio Nacional de Predicción del Instituto Nacional de Meteorología. Madrid: Instituto Nacional de Meteorología, 1996, p. 19-25 <http://hdl.handle.net/20.500.11765/3879>

Gayà M y Redaño A 1999: El tornado de L'Espluga de Francolí. Medidas de campo y tratamiento de imágenes digitalizadas. IV Simposio Nacional de Predicción del Instituto Nacional de Meteorología. Madrid, p. 345-350 <http://hdl.handle.net/20.500.11765/4278>

Gayà M. 2015. Els Fiblons a Espanya: Climatologia i catàleg de tornados i trombes. Universitat de les Illes Balears: 441 pp.

Gayà, M., Llasat, M.-C., and Arús, J.: 2011: Tornadoes and waterspouts in Catalonia (1950–2009), Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 1875-1883, doi:10.5194/nhess-11-1875-2011, 2011. (<http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/11/1875/2011/nhess-11-1875-2011.pdf>)

Jansà, A. 1997. A general view about mediterranean meteorology : cyclones and hazardous weather. INM/WMO International Symposium on cyclones and hazardous weather in the Mediterranean, Mallorca, Spain, April 14-19

López, JM y Arús, J 2004: [A Mediterranean derecho: Catalonia \(Spain\), 17th August 2003](#) Póster elaborado para la European Conference on Severe Storms (ECSS 2004) celebrada del 9-12 de noviembre de 2004 en León. <http://hdl.handle.net/20.500.11765/5982>

López, J.M. 2007 A Mediterranean derecho: Catalonia (Spain), 17th August 2003, Atmospheric Research, Volume 83, Issues 2–4, Pages 272-283, ISSN 0169-8095, <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2005.08.008>.

Mateo, J.; Ballart, D.; Brucet, C.; Aran M.; y Bech, J. 2009. A study of a heavy rainfall event and a tornado outbreak during the passage of a squall line over Catalonia, Atmospheric Research, Volume 93, Issues 1–3, Pages 131-146, ISSN 0169-8095, <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2008.09.030>

Morales, M. E.; Arús, J.; Llasat, M. C.; Castán, S. 2009: A database about the tornadic activity in Catalonia (NE Spain) since 1994 Plinius Conference Abstracts, Vol. 11, Plinius 11- 186 11th Plinius Conference on Mediterranean Storms POSTER <http://hdl.handle.net/20.500.11765/5981>

Pascual, R. y Callado, A., 2002: Mesoanalysis of recurrent convergence zones in north-eastern Iberian Peninsula, Proceedings of Second European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD), Delft, Holland, 18-22 November 2002.

Perea, C. 2018: La Helicidad Efectiva (SRHe) en la predicción de Supercélulas y Tornados. Curso Nuevos Desarrollos en el Atap y en la D.T. de Cataluña. Barcelona, Noviembre 2018

Pineda, N. et al. 2011: Aproximació a la climatologia de llamps a Catalunya : anàlisi de les dades de l'SMC per al període 2004-2008. – (Nota d'estudi del Servei Meteorològic de Catalunya ; 73) ISBN 9788439387282 ([http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2014/11/18130754/Nota\\_dEstudi\\_SMC\\_73\\_PRINT.pdf](http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2014/11/18130754/Nota_dEstudi_SMC_73_PRINT.pdf))

Plouvin E. 2018. Tornade du 07 Janvier 2018, Pyrénées-Orientales, France. Enquête de terrain. [https://www.lasemaineduroussillon.com/wp-content/uploads/2018/02/Tornade-du-07-01-2018\\_Bilan\\_EricPlouvin\\_LeciellduRoussillon\\_V3.pdf](https://www.lasemaineduroussillon.com/wp-content/uploads/2018/02/Tornade-du-07-01-2018_Bilan_EricPlouvin_LeciellduRoussillon_V3.pdf) (últim accés 26 d'octubre 2018).

Ramis C, Arús J, López JM, Mestres AM. 1997. Two cases of severe weather in Catalonia (Spain): an observational study. Meteorological Applications 4: 207–217, doi: [10.1017/S1350482797000510](https://doi.org/10.1017/S1350482797000510).

Ramis, C., López, J.M. and Arús, J. (1999) 'Two cases of severe weather in Catalonia (Spain). A diagnostic study', Meteorological Applications, 6(1), pp. 11–27. <https://doi.org/10.1017/S1350482799000869>

Riesco, J. y otros , 2015: Climatología de tornados en España Peninsular y Baleares ([http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Climatologia\\_tornados/Climatologia\\_tornados.pdf](http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Climatologia_tornados/Climatologia_tornados.pdf))

Rodríguez O, Bech J, Soriano JD, Castán S. 2018. A methodology for wind damage assessment from strong-convective winds events. A les XXIV Jornades Eduard Fontserè, Associació Catalana de Meteorologia, Barcelona. . ISBN 978-84-946462-2-6 @ACAM

Rodríguez, O. y Bech, J. 2018, Sounding - derived parameters associated with tornadic storms in Catalonia. Int. J. Climatol, 38: 2400-2414. doi:[10.1002/joc.5343](https://doi.org/10.1002/joc.5343)

Rodríguez, Oriol 2016: Estudi dels paràmetres derivats dels sondatges associats a tempestes tornàdiques



[http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/106044/1/TFM\\_OriolRodriguez.pdf](http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/106044/1/TFM_OriolRodriguez.pdf)

Rodríguez , O., Bech, J., Castán, S., Arús, J. 2018: El tornado del 7 de gener de 2018: de l'Alt Empordà al Rosselló. Treball de camp i anàlisi de les destrosses Poster XXIV Jornades Fontserè. ISBN 978-84-946462-2-6 @ACAM

Sánchez-Laulhé, JM., Rubin,J.B. y Arús, J: 2017: Las tromba marinas de San Feliu De Guíxols (2/IX/1965) y Málaga (8/III/1971): entre las más mediáticas del Siglo XX . Primera parte Tiempo y Clima Vol. 5, Núm. 56 Abril 2017 <http://pkp.ame-web.org/index.php/TyC/article/view/1173>

Soliño, A 2015. Estudio de los rastros de un tornado. Revista de Climatología. Vol. 15 (2015): 59-75 ISSN 1578-8768 <http://www.climatol.eu/reclim/reclim17f.pdf>

Soliño A y Gayà M: 1996: La Escala Fujita. Medida indirecta de la velocidad del viento en tornados: descripción y utilización en el reconocimiento de campo. III Simposio Nacional de Predicción del Instituto Nacional de Meteorología. Madrid: Instituto Nacional de Meteorología, 1996, p. 13-18 <http://hdl.handle.net/20.500.11765/3878>

Thompson, R.L., C.M. Mead, and R. Edwards, 2007: [Effective Storm-Relative Helicity and Bulk Shear in Supercell Thunderstorm Environments](https://doi.org/10.1175/WAF969.1). Wea. Forecasting, 22, 102–115, <https://doi.org/10.1175/WAF969.1>

Wind Science and Engineering Center. 2006. *A Recommendation for an Enhanced Fujita Scale (EF scale)*. <http://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/EFScale.pdf>

**Figura 1:** La tromba famosa por excelencia es la de Sant Feliu de Guíxols-Calonge-Palamós del 2 de septiembre de 1965. Sr. Jordi Rabell fotógrafo guixolense

[http://arxiunicipalguixols.blogspot.com.es/2012/02/la-tromba-marina-de-1965-en-](http://arxiunicipalguixols.blogspot.com.es/2012/02/la-tromba-marina-de-1965-en-color.html)



[color.html](http://arxiunicipalguixols.blogspot.com.es/2012/02/la-tromba-marina-de-1965-en-color.html)

**Figura 2:** en este caso de nota un desplazamiento del máximo de casos observados hacia la costa central claramente influenciado por la densidad de población





Fig. 7. Contours of tornado occurrence density for the periods 1960–2009 (a) and 1950–1979 (b). The interval contours are 1 case 0.5° x 0.5° latitude longitude.

**Figura 3:** En el trabajo de campo del tornado del 21 de marzo de 2006 de Ivars d’Urgell, por primera vez utilizamos la tecnología móvil Android con ploteo de Waypoints online y Google Earth



**Figura 4:** Total de fenómenos tornádicos registrados: 490 exactamente entre el 1 de septiembre de 1992 y el 1 de septiembre de 2018.



**Figura 5:** Distribución por meses **a**, por franjas horarias **b** y por intensidad EF **c**.




**Figura 6:** Distribución por comarcas: TORNADOS **a**, Mangas marinas **b**, Reventones **c** y


Tornados+Mangas(vistas des de costa correspondiente) **d**



**Figura 7:** Zonas de convergencia clásicas en la costa catalana (Pineda, N. et al. 2011)



**Figura 8:** Actividad eléctrica según AEMET-Sinobas **(a)** (Densidad anual de descargas eléctricas (Número de descargas / km<sup>2</sup>) 2003-2012 ) y Meteocat **(b)** Densidad de rayos (rayos NT km<sup>-2</sup> año<sup>-1</sup>) En una cuadrícula de 20 x 20 km, media del período 2004-2008.



**Figura 9:** Supercumulo tornádico. @Manuel Conde

